Interruption de grossesse par médicaments au 1^{er} trimestre Aide-mémoire clinique

Avant 10 SA, l'IG par médicaments est efficace et ne requiert aucune autre intervention dans 97,4%. Les complications majeures sont très rares (< 1%).

Avant de prescrire un IG par médicaments:

1. Confirmer l'admissibilité de la personne.
2. Informer sur les options de soins en IG du 1^{er} trimestre.
3. Expliquer le déroulement et le suivi requis.
4. Obtenir un consentement verbal de la personne qui demande l'interruption de grossesse.

Admissibilité à l'IG par médicaments:

- Accès à des informations claires et à des soins post-avortement en tout temps
- Absence de contre-indications
- Âge gestationnel (AG) $\leq$ 10-11 SA¹

Contre-indications absolues:

- Allergie à la mifépristone ou au misoprostol
- Grossesse extra-utérine (GEU)
- Porphyrie héréditaire
- Asthme non-contrôlé
- Insuffisance surrénalienne

Contre-indications relatives:

- Taux d'hémoglobine < 95 g/L
- Présence d'un stérilet
- Corticothérapie systémique à long terme

Indications d'échographie pré-IG:

- DDM inconnue ou cycle imprévisible ET absence d'examen physique pouvant estimer un AG $\leq$ 10 SA ;
- Facteurs de risque de GEU

Déroulement de l'IG par médicaments:

- Prendre 1 CO de Mifépristone 200 mg PO 24-48h plus tard prendre 4 CO de 200 mcg de misoprostol intra vaginal ou buccal
- Si aucune expulsion n'a eu lieu, proposer une deuxième dose de misoprostol 24h plus tard Proposer un dépistage urinaire de B-hCG 5 semaines après la prise de mifépristone

¹ Selon SOGC, AG $\leq$ 70 jours, mais AG $\leq$ 77 jours pour professionnel·les expérimenté·es.

Pour plus d'informations et références, consultez le Guide clinique *Interruption de grossesse par médicaments au 1^{er} trimestre* (RSFQ 2024).